

Tableau des antirétroviraux

Traitement/dosage	Effets secondaires	Contre-indications	Recommandations
Inhibiteur nucléotidique de la transcriptase inverse			
Viréad® (ténofovir) Laboratoires Gilead 300 mg/jour	troubles digestifs, nausées, diarrhées, flatulences, vomissements, diminution du phosphate sanguin d'où problèmes rénaux et osseux	opinavir, didanosine, antibiotiques de la famille des aminosides, foscarnet sodique, amphotéricine B, vancomycine, iséthionate de pentamidine, ganciclovir	à prendre au moment du repas, est contre indiqué en cas d'antécédents d'allergie au ténofovir, et si insuffisance rénale
Inhibiteur de protéase			
Agénérase® (amprénavir) Glaxo Smith Kline 1200 mg 2 fois / jour	Troubles gastro-intestinaux, éruptions cutanées, paralysie autour de la bouche.	terféfadine, astémizole, cisapride, pimozide, triazolam, diazépam, flurazépam, midazolam, dérivés de l'ergot de seigle, rifampicine, millepertuis.	à prendre avec précaution pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale ou hépatique.
Crixivan® (indinavir) Merck 800 mg 3 fois/jour	calculs rénaux, sécheresse cutanée, alopecie (perte de cheveux).	rifampicine, astémizole, cisapride, dihydroergotamine, ergotamine, terféfadine, ethinyl oestradiol.	à prendre à jeun, avec de l'eau, toutes les huit heures. Boire au minimum 1,5l d'eau pour éviter les calculs rénaux.
Fortovase® (saquinavir) 3,600 mg/jour Invirase® (saquinavir) 1,800 mg/jour Laboratoires Roche	Peu. La mauvaise biodisponibilité nuit à l'efficacité.	carbamazépine, efavirenz, névirapine, phénobarbital, phénytoïne, primidone, rifabutine, rifampicine, astémizole, cisapride, terféfadine.	à prendre dans les 2 heures qui suivent le repas. L'association Invirase + Norvir en baby dose est recommandée pour améliorer ses concentrations plasmatiques.
Kalétra® (lopinavir+ritonavir) Laboratoires Abbott 400 mg/100 mg 2 fois/jour	diarrhées, hypertriglycéridémies, pancréatites.	astémizole, terféfadine, midazolam, triazolam, cisapride, pimozide, amiodarone, alcaloïdes de l'ergot de seigle, millepertuis, rifampicine, disulfirame, metronidazole.	contre indiqué en cas d'insuffisance hépatique sévère.
Norvir® (ritonavir) Laboratoires Abbott 1,000 -1,200 mg/jour	troubles digestifs, diarrhées, élévation des triglycérides.	astémizole, cisapride, dihydroergotamine, ergotamine, terféfadine, primozide, rifampicine, efavirenz, midazolam, rifabutine, triazolam.	à prendre pendant le repas.
Viracept® (nelfinavir) Laboratoires Roche 750 mg 3 fois/jour	diarrhées.	rifampicine, astémizole, cisapride, dihydroergotamine, ergotamine, terféfadine.	surveiller les diarrhées.

Traitement/dosage	Effets secondaires	Contre-indications	Recommandations
Inhibiteur analogue nucléosidique de la transcriptase inverse			
Epivir® (3TC, lamivudine) Glaxo Smith Kline 300 mg/jour (150 mg 2 fois/jour)	maux de tête, fatigue.	zalcitabine.	pas de surveillance particulière.
Hivid® (ddC/zalcitabine) Laboratoires Roche 0,75 mg 3 fois/jour	rashes, aphtes, nausées, neuropathie, maux d'estomac, pancréatites.	lamivudine, didanosine, stavudine.	surveiller les risques de neuropathie et de pancréatite.
Rétrovir® (AZT/zidovudine) Glaxo Smith Kline 500-600 mg/jour	anémie, neutropénie.	stavudine, ribavirine.	suivi sanguin pour surveiller l'apparition éventuelle d'anémie (baisse des globules rouges) ou de neutropénie (baisse des globules blancs).
Videx® (ddl/didanosine) Bristol-Myers Squibb 400 mg/jour	maux d'estomac, diarrhées, pancréatites, neuropathies, maux de tête.	ganciclovir, zalcitabine.	prendre à jeun et à distance des autres médicaments, éviter l'alcool qui augmente le risque de pancréatite.
Zerit® (d4T/stavudine) Bristol-Myers Squibb 60 à 80 mg/jour	neuropathie, pancréatite.	zidovudine, doxorubicine, zalcitabine.	surveiller les risques de neuropathie et pancréatite. Il peut être impliqué dans l'apparition de lipoatrophies
Ziagen® (abacavir) Glaxo Smith Kline 600 mg/jour	fatigue, douleurs abdominales, hypersensibilité, rash, fièvres, nausées.	éthanol.	problèmes d'hypersensibilité qui peuvent nécessiter l'arrêt du traitement. Ne jamais reprendre le traitement.
Inhibiteur non-nucléosidique de la transcriptase inverse			
Rescriptor® (delavirdine) Pharmacia & Upjohn 400 mg 3 fois/jour	éruption cutanée sévère (rash).	rifampicine, rifabutine, astémizole, cisapride, dihydroergotamine, ergotamine, terféfadine, carbamazépine, phénytoïne, phénobarbital.	surveiller l'apparition d'éruption cutanée sévère (rash).
Sustiva® (efavirenz, DMP-266) DuPont Pharma 600 mg 1 fois/jour	troubles système nerveux central : ébriété, vertiges, cauchemars. Eruption cutanée parfois sévère (rash).	saquinavir, astémizole, cisapride, midazolam, terféfadine, triazolam, ethinyl-oestradiol, ritonavir.	à prendre au coucher. Si les effets secondaires sur le système nerveux se prolongent, parlez-en à votre médecin.
Viramune® (névirapine) Boehringer Ingelheim 200 mg/jour/14 jours puis 200 mg 2 fois/jour	Fièvres, éruption cutanée sévère (rash).	saquinavir, kétoconazole, ethinyl-oestradiol, rifampicine.	vous ne devez pas prendre Viramune en cas d'insuffisance hépatique sévère